

TURUN YLIOPISTO

Lääketieteellinen tiedekunta

SELÄNNE, LIISA: Olkapään eteen-alas suuntautuvan epävakauden uusintaleikkaushoidon tulokset Tyks:ssä 2002-2013 epäonnistuneen tähystys-Bankart-toimenpiteen jälkeen

Syventävien opintojen kirjallinen työ, 19s, 4 liites.

Ortopedia ja traumatologia

Maaliskuu 2018

---

Bankart toimenpide on yleinen kirurginen leikkaus hoidettaessa operatiivisesti eteen alas suuntautuvaa olkanivelen instabiliteetti- eli epävakausoiretta. Tässä toimenpiteessä labrum ja alemmat glenohumeraaliset ligamentit kiinnitetään ankkurein anatomisesti takaisin paikalleen tähystysteitse. Tulokset avoimesta ja artroskooppisesta Bankart toimenpiteestä ovat varsin samankaltaisia. Leikkaushoidosta huolimatta epävakausoireilu uusiutuu 5-44%:lla potilaista (Flinkkilä ym. 2010). Tällöin voidaan joutua harkitsemaan revisiotoimenpidettä. Revisiotoimenpiteiden tuloksista julkaistujen tutkimusten potilasmäärät ovat olleet pieniä ja potilasryhmät heterogeenisiä.

Lapaluun ja/tai olkaluun nivelpinnan luupuutosten katsotaan olevan merkittävä riskitekijä artroskooppisen Bankart toimenpiteen epäonnistumiselle (Burkhart SS, De Beer JF 2000). Luupuutostilanteessa suositellaan tehtäväksi ns. Latarjet toimenpide Bankart toimenpiteen sijaan (Burkhart ym. 2007). Latarjet toimenpiteessä lapaluun korppilisäke ja siihen liittyvä jänne irrotetaan ja siirretään lapaluun kaulaan nivelpinnan eteen subscapularislihaksen läpi. Latarjet toimenpiteestä on raportoitu varsin hyviä onnistumistuloksia.

Tämän syventävien opintojen opinnäytetyössä vertailtiin retrospektiivisesti kahden eri leikkaustoimenpiteen (artroskooppinen revisio Bankart vs. avoin revisio Latarjet) tuloksia epäonnistuneen primaaritoimenpiteen (artroskooppinen Bankart) jälkeen. Tutkimuspotilaat kerättiin toimenpide- ja diagnoosikoodien perusteella TYKS:n sairauskertomusjärjestelmästä vuosilta 2002-2013. Potilaat kutsuttiin kliiniseen tutkimukseen ja heistä otettiin olkanivelen röntgenkuvat. Lisäksi he täyttivät vointiaan koskevan potilaskyselyn elektronisesti. Saadut tulokset analysoitiin.

Syventävien opintojen tavoitteena oli muodostaa kuva instabiliteettipotilaiden saaman hoidon vaikuttavuudesta kahden eri toimenpidemenetelmän osalta epäonnistuneen artroskooppisen Bankart toimenpiteen jälkeen.

olkapää, uusintaleikkaus, Bankart, Latarjet