

Errata

Sivu 35 rivi 12

Epilepsialääkkeiden lisäävät kaatumisvaaraa (Hartikainen ym. 2007, Deandrea ym. 2010).

Pitäisi olla

Epilepsialääkkeet lisäävät kaatumisvaaraa (Hartikainen ym. 2007, Deandrea ym. 2010).

Sivu 74 rivi 15

Lääkärin hoitoon johti vanhemman ikäryhmän kaatumiset useammin kuin nuoremman (0.3 [0.6] vs. 0.6 [1.0]) ($p < 0.005$).

Pitäisi olla

Lääkärin hoitoon johti vanhemman ikäryhmän kaatumiset useammin kuin nuoremman (0.6 [1.0] vs. 0.3 [0.6]) ($p < 0.005$).

Sivu 117 rivi 4

Koeryhmän osallistujat, jotka lopettivat psyykenlääkkeen tai bentsodiatsepiiniryhmän lääkkeen käytön 12 kuukautta kestäneen ehkäisyohjelman aikana, kaatuivat ehkäisyohjelman jälkeisen 12 kuukauden aikana harvemmin kuin vertailuryhmään osallistuneet, jotka käyttivät niitä. Kolmen vuoden seurannassa koeryhmän jäsenet, jotka intervention aikana lopettivat psyykenlääkkeiden käytön, kaatuivat tilastollisesti lähes merkitsevästi vähemmän kuin näiden lääkkeiden käyttöä jatkaneet vertailutoimintaan osallistuneet ($p = 0.054$).

Pitäisi olla

Niiden koeryhmän jäsenten, jotka lopettivat psyykenlääkkeiden tai bentsodiatsepiiniryhmän lääkkeiden käytön tutkimuksen aikana, kaatumiset johtivat ehkäisyohjelman jälkeisen 12 kuukauden aikana harvemmin lääkärin hoitoon kuin niiden käyttöä jatkaneiden vertailuryhmän jäsenten. Kolmen vuoden seurannassa tulos psyykenlääkkeiden osalta oli lähes merkitsevä ($p = 0.054$).