

TURUN YLIOPISTO

Lääketieteellinen tiedekunta

PELTOLA, TUOMAS KRISTIAN: Recurrenspareesin yleisyys ja riskitekijät TYKSin  
kilpirauhasleikatuissa vuonna 2012

Syventävien opintojen kirjallinen työ, 22 sivua

Kirurgia

Maaliskuu 2016

---

Tutkielmassa tarkasteltiin retrospektiivisesti TYKSissä vuonna 2012 tehtyjä kilpirauhasleikkauksia ja niiden komplikaatioita keskittyen recurrenspareesiin. Komplikaatioita haettiin ensin tietojärjestelmähauulla leikkauskoodeilla potilaat, jonka jälkeen potilaiden sairaskertomuksista etsittiin leikkauskomplikaatioita ja otettiin ylös mahdollisia recurrenspareesin riskitekijöitä. Recurrenspareesin saaneista potilaista pyrittiin selvittämään potilastiedoista ja puhelinhaastattelulla, ovatko pareesioireet ohittuneet. Pareesi laskettiin pysyväksi mikäli potilas koki vielä oireita ja ohimeneväksi mikäli potilas oli oireeton. Lisäksi kysyttiin pystyykö henkilö nousemaan kahden kerroksen portaat hengästymättä, jotta saataisiin selville oliko potilailla objektiivisia oireita. Kilpirauhasleikkauksia tehtiin 243, joista pareeseja oli 24 (9,9%). Näistä ohimenneitä oli yhdeksän (3,7%), pysyviä oli 13 (5,3%) ja objektiivisesti oireita aiheuttavia oli kolmella (1,2%) potilaalla. Etenkin pysyvien pareesien suhteen osalta prosenttiosuus leikatuista oli suuri, mutta pareesioireiden ohittuminen selvitettiin potilaan oireista, eikä äänihuulten liikkeestä. Aiempi leikkaus ja yllättävämminkin struuma leikkausindikaationa havaittiin pareesin riskitekijäksi, mutta muut riskitekijät eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tämän tutkielman kanssa samaan aikaan toiset opiskelijat tekivät yhtäläisen tilastoinnin vuosista 2010 ja 2011, ja on mahdollista yhdistää aineistot vastaavuudessa, jolloin pystytään tarkastelemaan paremmin riskitekijöitä suuremmasta aineistossa.

Avainsanat: recurrenspareesi, kilpirauhaskirurgia