

TURUN YLIOPISTO

Lääketieteellinen tiedekunta

JOUTSINIEMI, SATU: Kohdunulkoinen raskaus

Syventävien opintojen kirjallinen työ, 10 sivua
Synnytys- ja naistentautioppi
Helmikuu 2017

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on koota yhteen yleistietoa kohdunulkoisesta raskaudesta sekä sen diagnostiikasta ja hoidosta. Tavoitteena on esittää asiat kliinikolle merkityksellisestä näkökulmasta tutkimustietoon pohjautuen. Artikkelit on haettu PubMed-tietokannasta.

Kohdunulkoisten raskauksien osuus kaikista raskauksista on alle 2 %. Suomessa esiintyvyys on laskussa riskitekijöiden, kuten tupakoinnin ja klamydiainfektioiden, vähenemisen vuoksi. Yleisimmät oireet kohdunulkoisessa raskaudessa ovat alavatsakipu ja gynekologiset vuotohäiriöt. Oireet voivat kuitenkin olla monimuotoiset, mikä tekee diagnostiikasta haastavaa. Diagnostiset tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa päivystyksellisesti. Kohdunulkoinen raskaus sijaitsee useimmiten munanjohtimessa. Jos kohdunulkoista raskautta ei diagnosoida ajoissa, voi munanjohdin revetä, josta tavallisesti seuraa verenvuoto vatsaonteloon. Tämä voi pahimmillaan olla hengenvaarallinen. Kohdunulkoisen raskauden hoito on joko konservatiivinen tai kirurginen. Kohdunulkoinen raskaus johtaa aina sikiön kuolemaan.

Tämä kirjallinen työ on osa syventäviä opintojani. Toinen osa koostui FinnBrain-tutkimukseen tehdystä tutkimusdatan tallennuksesta.

Asiasanat: kohdunulkoinen raskaus, ektooppinen raskaus