



Glukokortikoidiin reagoimaton imeväisen kutiseva ihottuma

Lastentautien päivystykseen tuli aiemmin terve seitsemän kuukauden ikäinen lapsi pari kuukautta kestäneen kutisevan ihottuman vuoksi. Glukokortikoidivoide ei ollut helpottanut tilannetta. Ihottuma oli alun perin alkanut punoittavista paukamista raajoissa ja sittemmin levinnyt joka puolelle kehoa. Lapsella ei ollut muita oireita, ja statuskin oli ihottumaa (**KUVA 1**) lukuun ottamatta moitteeton. Viimeksi kuluneiden viikkojen aikana myös äidille ja muutamalle muulle perheen kanssa samaan keittiökuntaan kuuluvalla henkilöllä oli ilmaantunut kutisevaa, näppyläistä ihottumaa.

Kliinisesti heräsi epäily syyhystä, ja diagnosoitiin varmistettiin ihotautilääkärin avustuksella. Kämmenistä ja jalkapohjista (**KUVA 2** ja **3**) löytyi useampia syyhykäytäviä, joista yhdestä saatiin kaivettua elävä syyhyypunkki mikroskoopin alle tarkasteltavaksi. Kunnan infektiontorjuntayksikkö hoiti samanaikaisesti koko keittökunnan. ■

JOHANNA MOMMO, lastentautien erikoislääkäri
 RAAKEL LUOTO, LT, lastentautien erikoislääkäri,
 neonatologi
 Tyks, lasten ja nuorten klinikka



KUVA 1. Syyhy vartalolla.



KUVA 2. Syyhy kämmenessä.



KUVA 3. Syyhy jalkapohjassa.